Impfempfehlungen (Stand 10/2024)

2 Monate	DPT Hib Polio Hep B (1) Pneumokokken (1) Men. B (1) evtl. Rotaviren (1)	
4 Monate (U4)	DPT Hib Polio Hep B (2) Pneumokokken (2) Men. B (2) evtl. Rotaviren (2)	
11 Monate (U6)	MMR Windpocken (1)	
12 Monate	Meningokokken C	Men. B (3)
13 Monate	DPT Hib Polio Hep B (3) Pneumokokken (3)	
16 Monate	MMR Windpocken (2)	
6 -7 Jahre	dPT	
11-12 Jahre	dPT Polio	danach alle 10 Jahre
9-17 Jahre	Impfung gegen HPV	(Impfschema: 0-6 Monate, 9-14 Jahre) (Impfschema: 0-2-4 Monate, 15-17 Jahre)

<u>Nachholimpfung bis 18 Jahre (vor Pubertät) falls bisher nicht geimpft:</u>

Men. C	einmalig
Hep B	0 - 1 - 6 Monate falls noch nicht gegen Hep B geimpft ab ca. 13 Jahre
MMR	0 - 1
Windpocken	0 – 1
Men. B	Bis zum 5. Geburtstag < 24 Monate 0 – 2 – 6 > 24 Monate 0 – 2

Im Erwachsenenalter alle 10 Jahre dPT

Über Impfung gegen FSME und Meningokokken ACWY beraten wir Sie gerne.

Es bedeuten:	D	Diphterie-Impfstoff für Kinder bis 5 Jahre
	d	Diphterie-Impfstoff für Kinder über 5 Jahre und Erwachsene
	P	Pertussis-Impfung (Keuchhusten)
	T	Tetanus-Impfung
	Hib	Haemophilus influenzae B- Impfung
	Hep B	Hepatitis B- Impfung
	Polio	Kinderlähmung-Totimpfstoff
	MMR	Mumps-Masern-Röteln Impfung
	HPV	Humaner Papillomavirus Impfung

Impfempfehlungen (Stand 10/2024)

2 Monate	DPT Hib Polio Hep B (1) Pneumokokken (1) Men. B (1) evtl. Rotaviren (1)	
4 Monate (U4)	DPT Hib Polio Hep B (2) Pneumokokken (2) Men. B (2) evtl. Rotaviren (2)	
11 Monate (U6)	MMR Windpocken (1)	
12 Monate	Meningokokken C	Men. B (3)
13 Monate	DPT Hib Polio Hep B (3) Pneumokokken (3)	
16 Monate	MMR Windpocken (2)	
6 -7 Jahre	dPT	
11-12 Jahre	dPT Polio	danach alle 10 Jahre
9-17 Jahre	Impfung gegen HPV	(Impfschema: 0-6 Monate, 9-14 Jahre) (Impfschema: 0-2-4 Monate, 15-17 Jahre)

<u>Nachholimpfung bis 18 Jahre (vor Pubertät) falls bisher nicht geimpft:</u>

Men. C	einmalig
Hep B	0 - 1 - 6 Monate falls noch nicht gegen Hep B geimpft ab ca. 13 Jahre
MMR	0 - 1
Windpocken	0 – 1
Men. B	Bis zum 5. Geburtstag < 24 Monate 0 – 2 – 6 > 24 Monate 0 – 2

Im Erwachsenenalter alle 10 Jahre dPT

Über Impfung gegen FSME und Meningokokken ACWY beraten wir Sie gerne.

Es bedeuten:

D	Diphterie-Impfstoff für Kinder bis 5 Jahre
d	Diphterie-Impfstoff für Kinder über 5 Jahre und Erwachsene
P	Pertussis-Impfung (Keuchhusten)
T	Tetanus-Impfung
Hib	Haemophilus influenzae B- Impfung
Hep B	Hepatitis B- Impfung
Polio	Kinderlähmung-Totimpfstoff
MMR	Mumps-Masern-Röteln Impfung
HPV	Humaner Papillomavirus Impfung