

## Impfempfehlungen (Stand 2/2024)



<b>2 Monate</b>	DPT Hib Polio Hep B (1) Pneumokokken (1) Men. B (1) evtl. Rotaviren (1)
<b>4 Monate (U4)</b>	DPT Hib Polio Hep B (2) Pneumokokken (2) Men. B (2) evtl. Rotaviren (2)
<b>11 Monate (U6)</b>	MMR Windpocken (1)
<b>12 Monate</b>	Meningokokken C
<b>13 Monate</b>	DPT Hib Polio Hep B (3) Pneumokokken (3) Men. B (3)
<b>16 Monate</b>	MMR Windpocken (2)
<b>6 -7 Jahre</b>	dPT
<b>11-12 Jahre</b>	dPT Polio danach alle 10 Jahre
<b>9-17 Jahre</b>	Impfung gegen HPV (Impfschema: 0-6 Monate, 9-14 Jahre) (Impfschema: 0-2-4 Monate, 15-17 Jahre)

### Nachholimpfung bis 18 Jahre (vor Pubertät) falls bisher nicht geimpft:

Men. C	einmalig
Hep B	0 - 1 - 6 Monate falls noch nicht gegen Hep B geimpft ab ca. 13 Jahre
MMR	0 - 1
Windpocken	0 – 1
Men. B	Bis zum 5. Geburtstag < 24 Monate 0 – 2 – 6 > 24 Monate 0 – 2

Im Erwachsenenalter alle 10 Jahre dPT

Über Impfung gegen FSME und Meningokokken ACWY beraten wir Sie gerne.

---

Es bedeuten:	D	Diphtherie-Impfstoff für Kinder bis 5 Jahre
	d	Diphtherie-Impfstoff für Kinder über 5 Jahre und Erwachsene
	P	Pertussis-Impfung (Keuchhusten)
	T	Tetanus-Impfung
	Hib	Haemophilus influenzae B- Impfung
	Hep B	Hepatitis B- Impfung
	Polio	Kinderlähmung-Totimpfstoff
	MMR	Mumps-Masern-Röteln Impfung
	HPV	Humaner Papillomavirus Impfung

## Impfempfehlungen (Stand 2/2024)



<b>2 Monate</b>	DPT Hib Polio Hep B (1) Pneumokokken (1) Men. B (1) evtl. Rotaviren (1)	
<b>4 Monate (U4)</b>	DPT Hib Polio Hep B (2) Pneumokokken (2) Men. B (2) evtl. Rotaviren (2)	
<b>11 Monate (U6)</b>	MMR Windpocken (1)	
<b>12 Monate</b>	Meningokokken C	
<b>13 Monate</b>	DPT Hib Polio Hep B (3) Pneumokokken (3) Men. B (3)	
<b>16 Monate</b>	MMR Windpocken (2)	
<b>6 -7 Jahre</b>	dPT	
<b>11-12 Jahre</b>	dPT Polio	danach alle 10 Jahre
<b>9-17 Jahre</b>	Impfung gegen HPV (Impfschema: 0-6 Monate, 9-14 Jahre) (Impfschema: 0-2-4 Monate, 15-17 Jahre)	

### Nachholimpfung bis 18 Jahre (vor Pubertät) falls bisher nicht geimpft:

Men. C	einmalig
Hep B	0 - 1 - 6 Monate falls noch nicht gegen Hep B geimpft ab ca. 13 Jahre
MMR	0 - 1
Windpocken	0 – 1

Men. B	Bis zum 5. Geburtstag < 24 Monate 0 – 2 – 6 > 24 Monate 0 – 2
--------	--

Im Erwachsenenalter alle 10 Jahre dPT

Über Impfung gegen FSME und Meningokokken ACWY beraten wir Sie gerne.

---

Es bedeuten:	D	Diptherie-Impfstoff für Kinder bis 5 Jahre
	d	Diptherie-Impfstoff für Kinder über 5 Jahre und Erwachsene
	P	Pertussis-Impfung (Keuchhusten)
	T	Tetanus-Impfung
	Hib	Haemophilus influenzae B- Impfung
	Hep B	Hepatitis B- Impfung
	Polio	Kinderlähmung-Totimpfstoff
	MMR	Mumps-Masern-Röteln Impfung
	HPV	Humaner Papillomavirus Impfung