

# Impfempfehlung (Stand 1.7.2020)



<b>2 Monate</b>	DPT Hib Polio Hep B (1)	Prevenar 13 (1)	evtl. Rotaviren (1)
<b>4 Monate (U4)</b>	DPT Hib Polio Hep B (2)	Prevenar 13 (2)	evtl. Rotaviren (2)
<b>11. Monate (U6)</b>	MMR	Windpocken (1)	
<b>12. Monate</b>	Meningokokken C		
<b>13 Monate</b>	DPT Hib Polio Hep B (3)	Prevenar 13 (3)	
<b>16 Monate</b>	MMR Windpocken (2)		
<b>6 -7 Jahre</b>	DPT		
<b>11-12 Jahre</b>	DPT Polio dann alle 10 Jahre		
<b>9-17 Jahre</b>	Impfung gegen HPV	( Impfschema: 0- 6 Monate, 9-14 J )	( Impfschema: 0-2-4 Monate, 15-17 J )

## **Nachholimpfung bis 18 Jahre (vor Pubertät) falls bisher nicht geimpft**

Men C	einmalig
Hep B	0 - 1 - 6 Monate falls noch nicht gegen Hep B geimpft ab ca.13 J
MMR	0 - 1
Windpocken	0 - 1

Im Erwachsenenalter alle 10 Jahre DPT

Über Impfung gegen FSME und Meningokokken B beraten wir Sie gerne.

---

Es bedeuten:	D	Diphtherie-Impfstoff für Kinder bis 5 Jahre
	d	Diphtherie-Impfstoff für Kinder über 5 Jahre und Erwachsene
	P	Pertussis-Impfung (Keuchhusten)
	T	Tetanus-Impfung
	Hib	Haemophilus influenzae B- Impfung
	Hep B	Hepatitis B- Impfung
	Polio	Kinderlähmung-Totimpfstoff
	MMR	Mumps-Masern-Röteln Impfung
	HPV	Humaner Papillomavirus Impfstoff

Kinderarztpraxis Dr. med. Johanna Diez-Grundel  
Rümelinstraße 12 - 72070 Tübingen

# Impfempfehlung (Stand 1.7.2020)



Kinderarztpraxis Dr. med. Johanna Diez-Grundel  
Rümelinstraße 12 - 72070 Tübingen